

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

MESSIPEN 10%

Κόνις αμπικιλίνης για πόσιμο διάλυμα 10% για μόσχους, αμνούς, ερίφια, χοίρους, πτηνά, σκύλους, γάτες

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της Αδειας Κυκλοφορίας:

PROVET A.E.

Λεωφ. Ελευθερίας 120, Ελεούσα Ιωαννίνων, Τ.Κ 45500

Τηλ.: +30 210 5508500

e-mail: vet@provet.gr

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

PROVET A.E. (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ)

Θέση Βραγκό, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 5508500, +30 210 55075770

e-mail: vet@provet.gr

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

MESSIPEN powder for oral solution

Κόνις για πόσιμο διάλυμα 10%

Ampicillin 10g/100g

μόσχοι, αμνοί, ερίφια, χοίροι, πτηνά, σκύλοι, γάτες

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Τα 100 g προϊόντος περιέχουν:

Δραστική ουσία : Ampicillin trihydrate 11,5 g (που αντιστοιχεί σε Ampicillin 10 g)

Έκδοχα: Sodium lauryl sulfate, Lactose

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το **MESSIPEN σκόνη για πόσιμο διάλυμα 10%** συνιστάται για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων που προκαλούνται από κατά Gram θετικούς και αρνητικούς μικροοργανισμούς. Ειδικότερα, συνιστάται στις ακόλουθες περιπτώσεις.

Σκύλος-Γάτα: λοιμώξεις του αναπνευστικού, του πεπτικού και του ουρογεννητικού συστήματος.

Μοσχάρια-Αμνοί-Ερίφια: λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος και γαστρεντερικές λοιμώξεις

Χοίροι: λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, κολοβακτηριδιακές μολύνσεις, σύνδρομο Μαστίτιδας-Μητρίτιδας-Αγαλαξίας (M.M.A.) και ερυθρά

Πτηνά: κολοβακτηριδιακές λοιμώξεις, παστεριδίωση, νεκρωτική εντερίτιδα, λοιμώδης κόρυζα (*Avibacterium paragallinarum*) και επιπλοκές της Χρόνιας Αναπνευστικής Νόσου.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χορηγείται σε ζώα με γνωστό ιστορικό υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες.

Να μη χορηγείται σε κουνέλια και τρωκτικά, όπως ινδικά χοιρίδια, κρικητούς και γερβίλους.

Να μη χορηγείται σε μόσχους, αμνούς και ερίφια μετά την έναρξη του μηρυκασμού.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μετά τη χορήγηση αμπικιλίνης από το στόμα είναι δυνατό να παρατηρηθούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας και σπανιότερα θανατηφόρο αναφυλακτικό shock. Επίσης, είναι δυνατό να παρατηρηθούν γαστρεντερικές διαταραχές.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες)

- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών)

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Μόσχοι, αμνοί, ερίφια, χοίροι, πτηνά, σκύλοι, γάτες

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορηγείται έπειτα από διάλυση στο πόσιμο νερό ή το γάλα στις εξής δόσεις:

Σκύλος-Γάτα: 10-20 mg αμπικιλλίνης/ kg σωματικού βάρους ανά 12 ώρες, δηλαδή 0,5-1 g MESSIPEN σκόνη για πόσιμο διάλυμα 10%/ 5 kg σ.β. ανά 12 ώρες. Η θεραπεία διαρκεί επί 3-5 ημέρες.

Μοσχάρι-Αμνοί-Ερίφια: 10-20 mg αμπικιλλίνης/ kg σ.β. ανά 12 ώρες, δηλαδή 1-2 g MESSIPEN σκόνη για πόσιμο διάλυμα 10%/ 10 kg σ.β. ανά 12 ώρες. Διάρκεια θεραπείας: 3-5 ημέρες

Χοίροι: 10-20 mg αμπικιλλίνης/ kg σ.β. ανά 12 ώρες, δηλαδή 1-2 g MESSIPEN σκόνη για πόσιμο διάλυμα 10%/ 10 kg σ.β. ανά 12 ώρες. Διάρκεια θεραπείας: 3-5 ημέρες. Στους χοίρους μπορεί να χορηγηθεί με το πόσιμο νερό.

Πτηνά: 3 g MESSIPEN σκόνη για πόσιμο διάλυμα 10%/10 L πόσιμου νερού επί 3-5 ημέρες. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, είναι δυνατό να χορηγηθούν 10 g/10 L νερού. Κατά τη διάρκεια της αγωγής, το φαρμακώχο νερό πρέπει να αποτελεί τη μοναδική πηγή πόσιμου νερού για τα πτηνά.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας των πτηνών το νερό που περιέχει το προϊόν να αποτελεί τη μοναδική πηγή πόσιμου νερού για τα πτηνά.

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία σε αμπικιλλίνη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:

Μοσχάρι-Χοίροι: 15 ημέρες

Αμνοί-Ερίφια-Πτηνά: 7 ημέρες

Αυγά: 7 ημέρες

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C.

Διάρκεια ζωής μετά την αραίωση (σε νερό ή στο γάλα) σύμφωνα με τις οδηγίες: 1 ημέρα

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Να μην χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα του. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η αμπικιλλίνη παρουσιάζει ασυμβατότητα με διαλύματα γλυκόζης και σουλφοναμίδες.

Η απορρόφησή της ελαττώνεται παρουσία τροφής.

13.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

15. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φάκελος των 100 g

Μεταλλικό βάζο του 1 kg

Σάκος των 5 kg και 25 kg

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

διατίθεται με συνταγή κτηνιάτρου
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777