

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

OXYVET clear spray

Αερόλυμα για τοπική χρήση για πρόβατα, αίγες, σκύλους, γάτες

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:

PROVET A.E.

Λεωφ. Ελευθερίας 120, Ελεούσα Ιωαννίνων, Τ.Κ 45500

Τηλ: +30 210 5508500

e-mail: vet@provet.gr

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

PROVET A.E. (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ)

Θέση Βραγκό, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 5508500, +30 210 55075770-3

e-mail: vet@provet.gr

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

OXYVET CLEAR spray

Αερόλυμα για τοπική χρήση

Οξυτετρακυκλίνη

2,2 g/ περιέκτη

για πρόβατο, σκύλο και γάτα

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κάθε περιέκτης των 95 g περιέχει:

Δραστική ουσία : Oxytetracycline HCl 2,2 g

Έκδοχα: Sodium docusate, Isopropyl myristate, Polysorbate 80, Isopropyl alcohol

Πρωωθητικά αέρια: Προπάνιο, Βουτάνιο

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το OXYVET CLEAR spray συνιστάται για τοπική εξωτερική χρήση για την πρόληψη και τη θεραπεία των τοπικών δερματικών λοιμώξεων, των λοιμώξεων του πέλματος (ποδοδερματίτιδες), των θηλών, των χειλέων και γενικά όλων των επιφανειακών δερματικών λοιμώξεων που προκαλούνται από μικρόβια ευαίσθητα στην οξυτετρακυκλίνη. Επίσης, συνιστάται η χρήση του για τη θεραπεία εγκαυμάτων, μετεγχειρητικών τραυμάτων και εκδορών.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών)

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Πρόβατα, Αίγες, Σκύλος, Γάτα

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το OXYVET CLEAR spray χρησιμοποιείται μόνο τοπικά. Ψεκάστε τις προσβεβλημένες περιοχές μία έως δύο φορές την ημέρα μέχρι την πλήρη επούλωση.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Σε σοβαρές καταστάσεις, όπως ποδοδερματίτιδες, η θεραπεία εφαρμόζεται έπειτα από χειρουργικό καθαρισμό.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Πρόβατα-Αίγες:

Κρέας & εδώδιμοι ιστοί: Μηδέν (0) ημέρες

Γάλα: Μηδέν (0) ημέρες

Σκύλος-Γάτα: Δεν απαιτείται.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.

Το δοχείο είναι υπό πίεση.

Να μην εκτίθεται στον ήλιο και σε θερμοκρασία άνω των 50°C.

Να μην τρυπηθεί ή καεί η φιάλη ακόμη και μετά τη χρήση.

Να μην εκτέμπεται το περιεχόμενό του προς φλόγα ή πυρακτωμένο σώμα.

Εύφλεκτο.

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα:

Να μην ψεκάσετε γύρω από τα μάτια. Στις περιπτώσεις που τα ασθενή ζώα δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία με OXYVET CLEAR spray, να σταματά η χρήση του και να επανεκτιμάται η διάγνωση.

Όπου είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται δοκιμές ευαισθησίας.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

Άτομα με πιθανή ή γνωστή υπερευαισθησία στις τετρακυκλίνες, πρέπει να αποφεύγουν την εισπνοή ή επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται γάντια και μάσκες προσώπου και να κρατάτε το προϊόν μακριά από τα μάτια. Η χρήση του πρέπει να γίνεται σε πολύ καλά αεριζόμενους χώρους. Να πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση. Μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Μην ψεκάσετε σε γυμνή φλόγα ή σε πυρακτωμένα υλικά.

Εγκυμοσύνη, γαλουχία:

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:

Δεν είναι γνωστή καμία.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

Ασυμβατότητες:

Δεν είναι γνωστή καμία.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιάλη αλουμινίου των 95 g

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

διατίθεται με συνταγή κτηνιάτρου

**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**