ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

OXYVET powder for oral solution 50%

Κόνις για πόσιμο διάλυμα οξυτετρακυκλίνης για χοίρους, όρνιθες, σκύλο, γάτα, μινκ

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
PROVET A.E.
Λεωφ. Ελευθερίας 120, Ελεούσα Ιωαννίνων, Τ.Κ 45500
Τηλ: +30 210 5508500
e-mail: vet@provet.gr

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
PROVET A.E. (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ)
Θέση Βραγκό, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 5508500, +30 210 55075770
e-mail: vet@provet.gr

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

OXYVET powder for oral solution 50%
Κόνις για πόσιμο διάλυμα
Oxytetracycline
50 g/100g
Χοίροι, Όρνιθες, Σκύλος, Γάτα, Μινκ

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Τα 100 g σκόνης περιέχουν:
Δραστική ουσία: 50 g Oxytetracycline HCl
Έκδοχα: Lactose

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το OXYVET 50% σκόνη για πόσιμο διάλυμα ενδείκνυται για τη θεραπεία συστηματικών και τοπικών λοιμώξεων. Πιο συγκεκριμένα συνιστάται σε:
Χοίροι: για βακτηριακές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος (όπως βρογχοπνευμονία και πλευροπνευμονία), σε λοιμώξεις του πεπτικού συστήματος (όπως βακτηριακή εντερίτιδα, κολοβακτηριδίωση, σαλμονέλωση), σε περιπτώσεις σηψαιμικών καταστάσεων, ερυθράς, καθώς και σε λοιμώξεις του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος (όπως πυελονεφρίτιδα, ενδομητρίτιδα, μαστίτιδα, προστατίτιδα κ.α.)
Όρνιθες: για βακτηριακές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, όπως δευτερογενείς λοιμώξεις που συνοδεύουν τη λοιμώδη βρογχίτιδα και λαρυγγοτραχειίτιδα, σε περιπτώσεις κολοβακτηριδιακής σηψαιμίας, χολέρας, τύφου, λοιμώδους κόρυζας, αρθροθυλακίτιδας, Χρόνιας Αναπνευστικής Νόσου (Χ.Α.Ν.) κ.α.
Σκύλος-Γάτα: για λοιμώξεις του αναπνευστικού, του πεπτικού, του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος, όπως πυελονεφρίτιδα, ενδομητρίτιδα, μαστίτιδα, προστατίτιδα κ.α. Επίσης, δίνει καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της χλαμυδίωσης, της αναπλάσμωσης, της ρικετσίωσης και της νοκαρδίωσης.
Μινκ: για τη θεραπεία συστηματικών και τοπικών λοιμώξεων, όπως βακτηριδιακή διάρροια κ.α.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χορηγείται σε ζώα με ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια.
Να μην αναμιγνύεται στη ζωοτροφή, γιατί είναι υδατοδιαλυτή σκόνη.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι τετρακυκλίνες τείνουν να συμπλοκοποιούν τα ιόντα ασβεστίου (η δοξυκυκλίνη λιγότερο), και να εναποτίθενται - μη αναστρέψιμα - στα αναπτυσσόμενα οστά και στα έγκλειστα δόντια των νεαρών

ζώων, ή ακόμα και του εμβρύου. Το φάρμακο που δεσμεύεται με αυτό τον τρόπο είναι φαρμακολογικά αδρανές.
Η χρήση των τετρακυκλινών σε ζώα που βρίσκονται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη καθώς και σε ζώα που βρίσκονται στην περίοδο ανάπτυξης των δοντιών μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό των δοντιών.
Η εντερική χλωρίδα μπορεί να επηρεαστεί, αν η θεραπεία παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε γαστρεντερικές διαταραχές.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη ((περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
-πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Χοίροι, Όρνιθες, Σκύλος, Γάτα, Μινκ

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το OXYVET 50% σκόνη για πόσιμο διάλυμα χορηγείται από το στόμα διαλυμένο στο πόσιμο νερό στην εξής δοσολογία ανά ημέρα.
Χοίροι: 30 mg οξυτετρακυκλίνης/kg σ.β. ή 3 g προϊόντος ανά 50 kg σ.β. για 5 ημέρες
Όρνιθες: 30 mg οξυτετρακυκλίνης/ kg σ.β. ή 0,06 g προϊόντος ανά kg σ.β. για 5 ημέρες
Σκύλος-Γάτα-Μινκ: 54 mg οξυτετρακυκλίνης/ kg σ.β. ή 0,11 g προϊόντος ανά kg σ.β. για 5 ημέρες
Η ημερήσια δοσολογία καλό είναι να χορηγείται σε δύο δόσεις.
Όταν το προϊόν χορηγείται, να μην υπάρχει άλλο διαθέσιμο νερό στα ζώα.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες.
Η χρήση των τετρακυκλινών σε ζώα που βρίσκονται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη καθώς και σε ζώα που βρίσκονται στην περίοδο ανάπτυξης των δοντιών μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό των δοντιών.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση πιθανής ή γνωστής υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες, η απευθείας επαφή ή εισπνοή πρέπει να αποφεύγονται. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται γάντια και μάσκες. Να πλένονται τα χέρια μετά τη χρήση.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Χοίροι: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 4 ημέρες
Όρνιθες: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 7 ημέρες
Όρνιθες: Αυγά: 6 ημέρες

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25^{o}C.
Διάρκεια ζωής μετά την αραίωση σύμφωνα με τις οδηγίες: 24 ώρες
Να μην χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα του. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι τετρακυκλίνες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με βακτηριοκτόνα αντιβιοτικά. Να μη χορηγούνται με υποκατάστατα γάλακτος. Η απορρόφησή τους από το έντερο μειώνεται με την παρουσία γάλακτος, αντιόξινων, καολίνης και παρασκευασμάτων σιδήρου.
Στα μονογαστρικά μπορεί να παρατηρηθεί ελάττωση της σύνθεσης και διάθεσης των βιταμινών του συμπλέγματος Β και Κ στο παχύ έντερο. Για λόγους προφύλαξης σε παρατεταμένης διάρκειας θεραπεία καλό είναι να χορηγούνται συμπληρώματα βιταμινών.
Να μην αναμιγνύονται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Γενικά, οι τετρακυκλίνες παρουσιάζουν ασυμβατότητα με πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες, τυλοζίνη, χλωραμφαινικόλη και υδροκορτιζόνη.

13.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σάκος των 5 kg και 25 kg
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

διατίθεται με συνταγή κτηνιάτρου

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777