

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

STOZZON-L tablets 300

δισκία λεβαμιζόλης για πρόβατα (κρεοπαραγωγή)

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:

PROVET A.E.

Λεωφ. Ελευθερίας 120, Ελεούσα Ιωαννίνων, Τ.Κ 45500

Τηλ: +30 210 5508500

e-mail: vet@provet.gr

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

PROVET A.E. (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ)

Θέση Βραγκό, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 5508500, +30 210 55075770

e-mail: vet@provet.gr

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

STOZZON-L[®] tablets

300mg/δισκίο

Πρόβατα

Δισκία Λεβαμιζόλης

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κάθε δισκίο περιέχει:

Δραστική ουσία: 300 mg Levamisole hydrochloride

Έκδοχα: Lactose, Polyvinylpyrrolidone (PVP), Microcrystalline cellulose, Sodium starch glucolate, Talc, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, Alcohol

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το STOZZON-L[®] είναι ανθελμινθικό ευρέος φάσματος κατά των νηματωδών παρασίτων. Χρησιμοποιείται για την πρόληψη και τη θεραπεία της γαστρεντερικής και πνευμονικής στρουγγυλίδωσης των προβάτων.

Ειδικότερα, η λεβαμιζόλη είναι πολύ αποτελεσματική κατά των ενήλικων (95-100%) και των άωρων (85-95%) μορφών των ειδών: *Haemonchus* spp., *Neoascaris vitulorum*, *Trichostrongylus* spp., *Chabertia ovina*, *Cooperia* spp., *Oesophagostomum* spp., *Nematodirus* spp., *Dictyocaulus* spp., *Marshallagia marshalli*, *Thelazia* spp. και *Bunostomum* spp.

Η λεβαμιζόλη είναι πολύ αποτελεσματική και κατά των ανθεκτικών στις βενζιμιδαζόλες στελεχών των *Haemonchus contortus*, *Ostertagia circumcincta* και *Trichostrongylus* spp. Ορισμένα, όμως, στελέχη των παρασίτων αυτών μπορεί να αναπτύξουν ανθεκτικότητα και κατά της λεβαμιζόλης. Η ανθεκτικότητα αυτή δε διασταυρώνεται με εκείνη των βενζιμιδαζολών.

Η λεβαμιζόλη είναι 80% αποτελεσματική κατά των ενήλικων και άωρων *Ostertagia* spp. Η λεβαμιζόλη είναι μερικώς αποτελεσματική (60-80%) κατά του *Protostrongylus rufescens* και του *Strongyloides papillosus* και πολύ λιγότερο (κάτω του 60%) κατά του *Trichuris* spp. Η λεβαμιζόλη δεν είναι αποτελεσματική κατά του *Muellerius capillaris* και του *Cystocaulus ocreatus*, καθώς και κατά των υποβιοτικών προνυμφών L₄ των *Ostertagia* spp. Επίσης, δεν έχει ωοκτόνους ιδιότητες.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η λεβαμιζόλη πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ζώα με νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μερικά ζώα μπορεί να γίνουν ανήσυχα, να παρουσιάσουν διέγερση και σιελόρροια μέσα σε λίγα μόνο λεπτά από τη χορήγηση του φαρμάκου.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών)

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Πρόβατα (κρεοπαραγωγά)

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η γενική δοσολογία της λεβαμιζόλης στα πρόβατα κρεοπαραγωγής είναι 7,5 mg/ kg σ.β., ειδικότερα 1 δισκίο STOZZON-L® 300 tabs των 300 mg/ 40 kg σ.β.

Τα δισκία χορηγούνται με ειδικό εκτοξευτήρα ή τοποθετούνται στη βάση της γλώσσας. Δεν απαιτείται διαίτα των ζώων πριν από τη χορήγηση.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Δεν αναφέρονται.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας: 7 ημέρες

Να μη χορηγείται σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα, τα οποία παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και ξηρό προστατευμένο από το φως.

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά τη χορήγηση κλωστριδιακών εμβολίων η παράλληλη χορήγηση λεβαμιζόλης βελτιώνει τον τίτλο των παραγόμενων αντισωμάτων.

Ασυμβατότητες

Η λεβαμιζόλη δεν πρέπει για 72 τουλάχιστον ώρες (3 ημέρες) μετά τη θεραπεία να συνδυάζεται με τετραχλωριούχο άνθρακα, εξαχλωροαιθάνιο, εξαχλωροφαίνη και σουλφοξείδιο της βιθειονόλης, γιατί οι συνδυασμοί αυτοί είναι τοξικοί.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΑΙΟΣ 2005

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί των 50 δισκίων σε blister

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

να διατίθεται μόνον με συνταγή κτηνιάτρου

**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**