

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ZADAREP oral solution

πόσιμο διάλυμα βιταμινών Α, D3, C, Ε για ιπποειδή, βοοειδή, χοίροι, όρνιθες, κουνέλια

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:

PROVET A.E.

Λεωφ. Ελευθερίας 120, Ελεούσα Ιωαννίνων, Τ.Κ 45500

Τηλ: +30 210 5508500

e-mail: vet@provet.gr,

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

PROVET A.E. (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ)

Θέση Βραγκό, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 5508500, +30 210 55075770

e-mail: vet@provet.gr

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ZADAREP® oral solution

πόσιμο διάλυμα

Vitamin A, E, D3, C

ιπποειδή, βοοειδή, χοίροι, όρνιθες, κουνέλια

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κάθε ml διαλύματος περιέχει:

Δραστικά συστατικά: 50.000 I.U. Vitamin A (ως palmitate), 5.000 I.U. Vitamin D₃,

30 mg Vitamin E (ως acetate), 100 mg Vitamin C (ως sodium ascorbate)

Έκδοχα: Butylated hydroxyanisole (BHA), Butylated hydroxytoluene (BHT), Ethoxyquin, Cremophor L, Glycerol, Disodium hydrogen phosphate, Citric acid, Potassium sorbate, Water

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αντιμετωπίζει τις πρωτογενείς και δευτερογενείς υποβιταμινώσεις Α, D₃, Ε και C. Συμπληρώνει τις ανάγκες του οργανισμού σε περιπτώσεις αυξημένων αναγκών (εγκυμοσύνη, γαλουχία, ωοπαράγωγή). Ενισχύει έμμεσα την αντίσταση του οργανισμού κατά των λοιμογόνων παραγόντων και διευκολύνει την ανάπτυξη ανοσίας έπειτα από τους εμβολιασμούς.

Επίσης, ενισχύει τον οργανισμό σε περιπτώσεις καταπόνησης (stress), όπως κατά τον απογαλακτισμό, τη μεταφορά, τις ομαδοποιήσεις, τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας κ.λ.π.

Ιδιαίτερα στα πτηνά η προσθήκη βιταμίνης C βοηθά στην αντιμετώπιση της υψηλής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της υψηλής ωοπαράγωγής και ενισχύει την ανθεκτικότητα του κελύφους του αυγού.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη ((περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών)

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Ιπποειδή, Βοοειδή, Χοίροι, Όρνιθες, Κουνέλια

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Γενικά συνιστώνται οι ακόλουθες δόσεις, που ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης, χορηγούνται εφάπαξ ή για 2-5 συνεχόμενες ημέρες.

Χορηγείται από του στόματος. Διαλύεται στο νερό ή το γάλα λίγο πριν από τη χορήγηση και δίνεται πάντα φρέσκο.

Ανά 100 νεοσσούς

1 ημέρας: 2 ml/ ½ L νερού

4 εβδομάδων: 10 ml/ 1 L νερού

Ανά 100 πουλάδες

8 εβδομάδων: 10 ml/ 2 L νερού

12 εβδομάδων: 10 ml/ 3 L νερού

16 εβδομάδων: 10 ml/ 4 L νερού

Ανά 100 φωτόκες ή κότες αναπαραγωγής: 20 ml/ 6 L νερού

Ανά χοιρίδιο: 1 ml

Ανά χοιρομητέρα: 6 ml

Ανά μόσχο-πώλο: 5 ml

Ανά άλογο: 10 ml

Ανά κουνέλι: 2 ml

Διαλύεται στο νερό ή το γάλα λίγο πριν από τη χορήγηση και δίνεται πάντα φρέσκο.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Δεν απαιτούνται.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν απαιτείται.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα: 30 ημέρες.

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα του. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα

12. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν απαιτούνται.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008**

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Φιάλη αλουμινίου των 100 ml και 1000 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

διατίθεται με συνταγή κτηνιάτρου

**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**